

Potenzen

Basis Exponent Tritt eine reelle Zahl a in einem Produkt n -mal als Faktor auf, so schreibt man dafür kurz a^n und nennt a^n die " n -te Potenz von a ": $a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a = a^n$
 Die Zahl a nennt man "Basis" oder Grundzahl, die Zahl n "Exponent" oder Hochzahl.
 Beispiele: $2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^3$; $0,5 \cdot 0,5 \cdot 0,5 \cdot 0,5 \cdot 0,5 = 0,5^5$; $(-6) \cdot (-6) \cdot (-6) \cdot (-6) = (-6)^4$

Negative ganzzahlige Exponenten Für die Exponenten 0 und 1 sowie für negative ganze Zahlen als Exponenten wird festgelegt:
 $a^1 = a$; $a^0 = 1$ für $a \neq 0$ $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ für $a \neq 0$; $n \in \mathbb{Z}$
 Beispiele: $5^1 = 5$; $1,8^0 = 1$; $(-\sqrt{2})^0 = 1$; $3^{-4} = 3^4$ $3,75^{-3} = \frac{1}{3,75^3}$

Zehnerpotenzen Eine Potenz mit der Basis 10 und ganzzahligem Exponenten heißt Zehnerpotenz.
 Beispiele: $10^3 = 1\ 000$; $10^5 = 100\ 000$; $10^6 = 1\ 000\ 000$; $10^{12} = 1\ 000\ 000\ 000\ 000$
 $10^{-3} = 0,001$; $10^{-5} = 0,000\ 01$; $10^{-6} = 0,000\ 001$; $10^{-12} = 0,000\ 000\ 000\ 001$
 Wird eine betragsmäßig sehr große oder sehr kleine Zahl als Produkt aus einer Zahl a mit $1 \leq |a| < 10$ und einer Zehnerpotenz dargestellt, so spricht man von der "wissenschaftlichen Schreibweise" oder vom "schreiben mit abgetrennter Zehnerpotenz".
 Beispiele: $3,2 \cdot 10^6 = 3\ 200\ 000$; $-3,2 \cdot 10^6 = -3\ 200\ 000$; $3,2 \cdot 10^{-6} = 0,000\ 003\ 2$

n -te Wurzel Wurzelexponent Radikand Die Quadratwurzel \sqrt{a} für $a > 0$ ist definiert als diejenige nicht negative Zahl, deren Quadrat a ist: $(\sqrt{a})^2 = a$. Entsprechend kann man auch die Basen von n -ten Potenzen als n -te Wurzeln verstehen:
 Mit $\sqrt[n]{a}$ bezeichnet man diejenige nicht negative Zahl, deren n -te Potenz a ist: $(\sqrt[n]{a})^n = a$ für $a > 0$ und $n \in \mathbb{N}$. n heißt "Wurzelexponent", a heißt "Radikand".
 Beachte: ❶ Das Potenzieren einer nicht negativen reellen Zahl mit n lässt sich durch Ziehen der n -ten Wurzel ("Radizieren") rückgängig machen und umgekehrt.
 ❷ n -te Wurzeln aus negativen Zahlen sind nicht definiert.
 ❸ Für $\sqrt[n]{a}$ schreibt man in der Regel \sqrt{a} .
 Beispiele: $\sqrt[3]{8} = 2$, denn $2^3 = 8$; $\sqrt[4]{81} = 3$, denn $3^4 = 81$; $\sqrt[5]{-32}$ ist nicht definiert

Rationale Exponenten Mithilfe der n -ten Wurzel lässt sich für nicht negative Basen a der Potenzbegriff auf rationale Exponenten p ($p = m/n$; $n \in \mathbb{N}$; $n \neq 0$; $m \in \mathbb{Z}$) erweitern:
 ❶ $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$ ❷ $a^p = a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$
 Beispiele: $5^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{5}$ $5^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{5^2}$ $5^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{\sqrt[3]{5^2}}$ $(-5)^{\frac{2}{3}}$ ist nicht definiert

Irrationale Exponenten Potenzen können auch für irrationale Exponenten definiert werden. Eine gute rationale Näherung für den Exponenten liefert auch eine gute Näherung für die Potenz.
 Beispiele: $\sqrt{2} = 1,414$; $5^{\sqrt{2}} = 5^{1,414} = 9,74$

Potenzgesetze

Multiplizieren/ Dividieren bei gleicher Basis Potenzen mit gleicher Basis werden multipliziert bzw. dividiert, indem man die Exponenten addiert bzw. subtrahiert und die Basis beibehält:
 ❶ $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ ❷ $a^m : a^n = a^{m-n}$
 Beispiele: ❶ $2^5 \cdot 2^3 = 2^{5+3} = 2^8 = 256$ ❷ $2^5 : 2^3 = 2^{5-3} = 2^2 = 4$

Multiplizieren/Dividieren bei gleichem Exponenten Potenzen mit gleichem Exponenten werden multipliziert bzw. dividiert, indem man die Basen multipliziert oder dividiert und den Exponenten beibehält.
 ❶ $a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$ ❷ $a^n : b^n = (a:b)^n$
 Beispiele: ❶ $2^3 \cdot 5^3 = (2 \cdot 5)^3 = 10^3 = 1000$ ❷ $10^3 : 5^3 = (10:5)^3 = 2^3 = 8$

Potenzieren von Potenzen Potenzen werden potenziert, indem man die Exponenten multipliziert und die Basis beibehält: $(a^n)^m = a^{n \cdot m}$
 Beispiele: $(2^4)^2 = 2^{4 \cdot 2} = 2^8 = 256$ $(2^4)^{-2} = 2^{4 \cdot (-2)} = 2^{-8} = \frac{1}{256}$
 Für die Wurzelschreibweise bei rationalen Exponenten folgt daraus ($k, n \in \mathbb{N}$; $n \neq 0$; $m \in \mathbb{Z}$; $a > 0$):
 ❶ $(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$ ❷ $\sqrt[kn]{a^{km}} = (\sqrt[n]{a})^m$
 Beispiele: ❶ $(\sqrt[3]{2})^2 = \sqrt[3]{2^2} = \sqrt[3]{4}$ ❷ $(\sqrt[12]{2^8}) = \sqrt[3]{2^2} = \sqrt[3]{4}$

Seite 2	Potenzen und Wurzeln	
Aufgabe	Lösung	Erläuterung

1. Potenzen mit natürlichem und ganzzahligen Exponenten

1.1. Berechne folgende Potenzen

a) 25	b) $\left(\frac{2}{3}\right)^6$	a) $= 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$	<p>Treten Potenzen auf, deren Exponenten natürliche Zahlen sind, dann beachte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ist die Basis negativ und der Exponent ungerade, dann ist der Potenzwert negativ [Aufg. d), f)]. • Eine Potenz mit dem Exponenten 1 hat den Wert der Basis [Aufg. e), f)]. • Eine Potenz mit dem Exponenten 0 hat den Wert 1 [Aufg. g)]. • Eine Potenz mit der Basis 0 und dem Exponenten 0 ist nicht definiert [Aufg. h)].
c) $(-3)^4$	d) $(-5)^3$	b) $= 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 81$	
e) 10^1	f) $(-0,1)^1$	c) $(-3) \cdot (-3) \cdot (-3) \cdot (-3) = 81$	
g) 1.5°	h) 0^0	d) $(-5) \cdot (-5) \cdot (-5) = -125$	
		e) = 10	
		f) = -0,1	
		g) = 1	
		h) unbestimmter Ausdruck, kann so nicht berechnet werden	

1.2. Schreibe ohne negative Exponenten

a) 3^{-4}	b) $3 \cdot 2^{-5}$	a) $3^{-4} = \frac{1}{3^4}$	<p>Treten Potenzen mit ganzzahligen Exponenten auf, dann beachte (für $a \neq 0$ und $n \in \mathbb{N}$):</p> $a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad \text{und} \quad a^n = \frac{1}{a^{-n}}$ <p>Hinweis: Durch das Ändern des Vorzeichens des Exponenten kannst du eine Potenz vom Nenner in den Zähler bringen und umgekehrt.</p>
c) $\frac{1}{6^{-10}}$	d) $\frac{3}{8^{-5}}$	b) $3 \cdot 2^{-5} = 3 \cdot \frac{1}{2^5} = \frac{3}{2^5}$	
e) x^{-1}	f) $2x^{-3}$	c) $\frac{1}{6^{-10}} = 6^{10}$	
		d) $\frac{3}{8^{-5}} = 3 \cdot 8^5$	
		e) $x^{-1} = \frac{1}{x}$	
		f) $2x^{-3} = \frac{2}{x^3}$	

1.3. Schreibe ohne Bruchstrich

a) $\frac{1}{2^5}$	b) $\frac{3}{10}$	a) $\frac{1}{2^5} = 2^{-5}$
c) $\frac{1}{x}$	d) $\frac{3y}{x^5}$	b) $\frac{3}{10} = 3 \cdot 10^{-1}$
		c) $\frac{1}{x} = x^{-1}$
		d) $\frac{3y}{x^5} = 3 \cdot x^{-5} \cdot y$

1.4. Berechne

a) $9^3 \cdot 9^{-3}$	b) $(2x)^{-1} \cdot 2x$	a) $9^3 \cdot 9^{-3} = 9^3 \cdot \frac{1}{9^3} = 1$	<p>Beachte beim Rechnen mit und beim Umformen von Potenzen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 a^{-n} ist der Kehrwert von a^n, das heißt: $a^n \cdot a^{-n} = 1$ [Aufgabe a) und b)] 2 Vorrangregeln Potenzrechnung geht vor Punkt-rechnung und vor Strichrechnung!
c) $1 - (-2)^4$	d) $-(-4)^3$	b) $(2x)^{-1} \cdot 2x = \frac{1}{2x} \cdot 2x = 1$	
e) $2 \cdot 6^3$	f) $3 : (-2)^3$	c) $1 - (-2)^4 = 1 - 16 = 15$	
g) $5 \cdot 10^{-5}$	h) $\frac{2}{10^{-6}}$	d) $-(-4)^3 = -(-64) = 64$	
i) $1 - \frac{12^{-3}}{10}$	j) $\frac{2^{-4}}{3^{-5}}$	e) $2 \cdot 6^3 = 2 \cdot 216 = 432$	
		f) $3 : (-2)^3 = 3 : (-8) = -\frac{3}{8}$	
		g) $5 \cdot 10^{-5} = \frac{5}{100\,000} = \frac{1}{20\,000}$	
		h) $\frac{2}{10^{-6}} = 2 \cdot 10^6 = 2\,000\,000$	
		i) $1 - \frac{12^{-3}}{10} = 1 - \frac{1}{12^3} \cdot \frac{1}{10} = 1 - \frac{1}{1728 \cdot 10}$ $= 1 - \frac{1}{17280} = \frac{17279}{17280}$	
		j) $\frac{2^{-4}}{3^{-5}} = \frac{3^5}{2^4} = \frac{243}{16}$	

2. Zahlen mit Zehnerpotenzen

2.1. Schreibe ohne Potenzen

a) $3 \cdot 10^3$	a) $3 \cdot 10^3 = 3\,000$
b) $5,6 \cdot 10^6$	b) $5,6 \cdot 10^6 = 5\,600\,000$
c) $1,125 \cdot 10^2$	c) $1,125 \cdot 10^2 = 112,5$
d) $3,68 \cdot 10^5$	d) $3,68 \cdot 10^5 = 368\,000$
e) $3 \cdot 10^{-3}$	e) $3 \cdot 10^{-3} = 0,003$
f) $5,6 \cdot 10^{-6}$	f) $5,6 \cdot 10^{-6} = 0,000\,005\,6$
g) $1,125 \cdot 10^{-2}$	g) $1,125 \cdot 10^{-2} = 0,011\,25$
h) $3,68 \cdot 10^{-5}$	h) $3,68 \cdot 10^{-5} = 0,000\,036\,8$

Zehnerpotenzen sind die Stufenzahlen unseres Stellenwertsystems. 10^n ist eine 1 mit n Nullen, 10^{-n} bedeutet, dass die 1 an n-ter Stelle nach dem Komma steht und davor nur Nullen.

Aufgabe 2.1:

Bei der Multiplikation mit einer Zehnerpotenz wird das Komma verschoben - und zwar um |n| Stellen nach rechts | links wenn der Exponent n positiv | negativ ist.

2.2. Schreibe mit abgetrennter Zehnerpotenz

a) 400 000	a) $400\,000 = 4 \cdot 10^5$
b) 21 000 000	b) $21\,000\,000 = 2,1 \cdot 10^7$
c) 20 481	c) $20\,481 = 2,048 \cdot 10^4$
d) 975	d) $975 = 9,75 \cdot 10^2$
e) 0,000 5	e) $0,000\,5 = 5 \cdot 10^{-4}$
f) 0,24	f) $0,24 = 2,4 \cdot 10^{-1}$
g) 0,000 060 7	g) $0,000\,060\,7 = 6,07 \cdot 10^{-5}$
h) 0,001 58	h) $0,001\,58 = 1,58 \cdot 10^{-3}$

Aufgabe 2.2.:

Eine positive Zahl mit abgetrennter Zehnerpotenz zu schreiben heißt, sie in ein Produkt aus einem Faktor $1 \leq a < 10$ und einer Zehnerpotenz zu zerlegen. Gehe so vor:

1. Verschiebe das Komma hinter die von links aus gesehene erste von 0 verschiedene Ziffer.
2. Zähle die Anzahl der Stellen, um die du verschoben hast. Sie gibt den Betrag des Exponenten an. Sein Vorzeichen ist positiv | negativ wenn du das Komma nach links | rechts verschoben hast.
3. Schreibe als Produkt $a \cdot 10^n$.

2.3. Berechne oder vereinfache so weit wie möglich

a) $3 \cdot 10^6 + 5,6 \cdot 10^6$	a) $= (3 + 5,6) \cdot 10^6$ $= 8,6 \cdot 10^6 = 8\,600\,000$
b) $4 \cdot 2^{-2} - 7 \cdot 2^{-2}$	b) $= (4 - 7) \cdot 2^{-2} = -3 \cdot 2^{-2}$ $= -3 \cdot \frac{1}{2^2} = -\frac{3}{4}$
c) $-6 \cdot 5^n + 8 \cdot 5^n$	c) $= (-6 + 8) \cdot 5^n = 2 \cdot 5^n$
d) $c^{-5} - 5 \cdot c^{-5}$	d) $= (1 - 5) \cdot c^{-5} = -4 \cdot c^{-5}$
e) $a \cdot 2^x + 4a \cdot 2^x$	e) $= (a + 4a) \cdot 2^x = 5a \cdot 2^x$
f) $5a \cdot 4^{2y} - 7b \cdot 4^{2y}$	f) $= (5a - 7b) \cdot 4^{2y}$

Treten in Summen und Differenzen Potenzen auf, so kannst du diese zusammenfassen, wenn Basen und Exponenten gleich sind. Gehe so vor:

1. Klammere die Potenz aus.
2. Berechne oder vereinfache.

Hinweis

Potenzen bezeichnen reelle Zahlen. Für sie gilt das Distributivgesetz:
 $b \cdot a^n \pm c \cdot a^n = (b \pm c) \cdot a^n$

3. Multiplizieren und Dividieren

3.1. Potenzen mit gleicher Basis

a) $3^2 \cdot 3^3$	b) $2^5 \cdot 2^{-2}$	a) $3^2 \cdot 3^3 = 3^{2+3} = 3^5 = 243$
c) $a^{-8} \cdot a^9$	d) $5^x \cdot 5^{-2x}$	b) $2^5 \cdot 2^{-2} = 2^{5-2} = 2^3 = 8$
e) $c^x \cdot c^{x-y}$	f) $6^3 : 6^2$	c) $a^{-8} \cdot a^9 = a^{-8+9} = a^1 = a$
g) $5^3 \cdot 5^{-2}$	h) $a^{-7} : a^{-1}$	d) $5^x \cdot 5^{-2x} = 5^{x-2x} = 5^{-x} = \frac{1}{5^x}$
i) $c^x : c^{x-y}$		e) $c^x \cdot c^{x-y} = c^{x+x-y} = c^{2x-y}$
		f) $6^3 : 6^2 = 6^{3-2} = 6^1 = 6$
		g) $5^3 : 5^{-2} = 5^{3+2} = 5^5 = 3125$
		h) $a^{-7} : a^{-1} = a^{-7+1} = a^{-6} = \frac{1}{a^6}$
		i) $c^x : c^{x-y} = c^{x-(x-y)} = c^y$

Um Potenzen mit gleicher Basis zu multiplizieren bzw. zu dividieren, gehe so vor:
 1. Potenziere die Basis mit der Summe bzw. der Differenz der Exponenten.
 2. Berechne oder vereinfache.

Merke: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
 $a^m : a^n = a^{m-n}$

3.2. Potenzen mit gleichem Exponenten

a) $3^4 \cdot 2^4$	a) $(3 \cdot 2)^4 = 6^4 = 1296$	
b) $2^{-3} \cdot 5^{-3}$	b) $(2 \cdot 5)^{-3} = 10^{-3} = 0,001$	
c) $(3a)^n \cdot (0,5b)^n$	c) $(3a \cdot 0,5b)^n = (1,5ab)^n$	
d) $2^3 : 4^3$	d) $(2 : 4)^3 = (\frac{1}{2})^3 = \frac{1}{8}$	
e) $8^{-5} : 4^{-5}$	e) $(8 : 4)^{-5} = 2^{-5} = (\frac{1}{2})^5 = \frac{1}{32}$	
f) $(6a)^n : (2ab)^n$	f) $(6a : 2ab)^n = (\frac{6a}{2ab})^n = (\frac{3}{b})^n$	
g) $\frac{(x^2 + x)^3}{8x^3}$	g) $\frac{(x^2 + x)^3}{(2x)^3} = (\frac{x^2 + x}{2x})^3 =$ $= (\frac{x(x+1)}{2x})^3 = (\frac{x+1}{2})^3$	

Um Potenzen mit gleichem Exponenten zu multiplizieren bzw. zu dividieren, gehe so vor:
 1. Potenziere das Produkt bzw. den Quotienten der Basen mit dem Exponenten.
 2. Berechne oder vereinfache.

Merke: $a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$
 $a^n : b^n = (a : b)^n$

3.3. Potenzieren von Potenzen

a) $(3^2)^3$	b) $(3^{-2})^3$	a) $(3^2)^3 = 3^{2 \cdot 3} = 3^6 = 729$
c) $((-3)^2)^3$	d) $((-3)^3)^3$	b) $(3^{-2})^3 = 3^{-2 \cdot 3} = 3^{-6} = 1/729$
e) $(a^2)^{n+1}$	f) $(b^{x+y})^{x-y}$	c) $((-3)^2)^3 = (-3)^{2 \cdot 3} = (-3)^6 = 729$
		d) $((-3)^3)^3 = (-3)^{3 \cdot 3} = (-3)^9 = -19683$
		e) $(a^2)^{n+1} = a^{2(n+1)} = a^{2n+2}$
		f) $(b^{x+y})^{x-y} = b^{(x+y)(x-y)} = b^{x^2 - y^2}$

Um Potenzen zu potenzieren, gehe so vor:
 1. Potenziere die Basis mit dem Produkt der Exponenten.
 2. Berechne oder vereinfache.

Merke: $(a^n)^m = (a)^{n \cdot m}$

3.4. Potenzterme vereinfachen

a) $2a^3(4a^2 + 3a^4b - b^5)$	a) $= 8 \cdot a^3 \cdot a^2 + 6 \cdot a^3 \cdot a^4b - 2 \cdot a^3 \cdot b^5$ $= 8a^5 + 6a^7b - 2a^3b^5$	
b) $3(3^m - 3^{2n})$	b) $= 3 \cdot 3^m - 3 \cdot 3^{2n} = 3^{m+1} - 3^{2n+1}$	
c) $(x^n - x^{n+3}) : x^n$	c) $= x^n : x^n - x^{n+3} : x^n = 1 - x^3$	
d) $[(x^{-3} + y^4)(x^{-3} - y^4)]^2$	d) $= [(x^{-3})^2 - (y^4)^2]^2 = (x^{-6} - y^8)^2$ $= (x^{-6})^2 - 2x^{-6}y^8 + (y^8)^2$ $= x^{-12} - 2x^{-6}y^8 + y^{16}$ $= \frac{1}{x^{12}} - 2\frac{y^8}{x^6} + y^{16}$	
e) $4(4^x + 2^{2x} - 4)$	e) $= 2^2 \cdot 2^{2x} + 2^2 \cdot 2^{2x} - 2^2 \cdot 2^2$ $= 2^{2x+2} + 2^{2x+2} - 2^4$ $= 2 \cdot 2^{2x+2} - 2^4 = 2^{2x+3} - 16$	

Um Terme mit Potenzen zu vereinfachen, kannst du alle bekannten Regeln zur Termumformung anwenden, insbesondere

- das Distributivgesetz.
- die binomischen Formeln.

Bei manchen Termen ist es angebracht, zunächst einmal für gleiche Basen zu sorgen [Aufg. e]. Vereinfache anschließend mithilfe der Potenzgesetze wenn es möglich ist.

Merke: Für Summen und Differenzen gibt es keine Potenzgesetze. Da sind nur die Binomischen Formeln möglich.

4. Wurzelausdrücke

4.1. Berechne ohne Taschenrechner

a) ${}^4\sqrt{16}$

b) ${}^3\sqrt{64}$

a) ${}^4\sqrt{16} = {}^4\sqrt{2^4} = 2$

c) ${}^5\sqrt{\frac{1}{100\,000}}$

d) ${}^3\sqrt{\frac{125}{64}}$

b) ${}^3\sqrt{64} = {}^3\sqrt{4^3} = 4$

c) ${}^5\sqrt{\frac{1}{100\,000}} = {}^5\sqrt{\left(\frac{1}{10}\right)^5} = \frac{1}{10}$

e) ${}^4\sqrt{0,0001}$

d) ${}^3\sqrt{\frac{125}{64}} = {}^3\sqrt{\left(\frac{5}{4}\right)^3} = \frac{5}{4}$

e) ${}^4\sqrt{0,0001} = {}^4\sqrt{10^{-4}} = 0,1$

Lässt sich der Radikand als Potenz mit dem Exponenten n schreiben, kannst du auch ohne Taschenrechner die n -te Wurzel ziehen. Für $a \geq 0$ gilt:

$${}^n\sqrt{a^n} = a$$

4.2. Schreibe als Wurzel

a) $3^{\frac{1}{5}}$

b) $3^{-\frac{1}{5}}$

c) $a^{\frac{1}{10}}$

d) $(xy)^{\frac{1}{3}}$

e) $15^{\frac{5}{6}}$

f) $15^{-\frac{5}{6}}$

g) $25^{-0,75}$

h) $(xy)^{1,6}$

a) $3^{\frac{1}{5}} = {}^5\sqrt{3}$

b) $3^{-\frac{1}{5}} = \frac{1}{3^{\frac{1}{5}}} = \frac{1}{{}^5\sqrt{3}}$

c) $a^{\frac{1}{10}} = {}^{10}\sqrt{a}$

d) $(xy)^{\frac{1}{3}} = {}^3\sqrt{xy}$

e) $15^{\frac{5}{6}} = {}^6\sqrt{15^5}$

f) $15^{-\frac{5}{6}} = \frac{1}{15^{\frac{5}{6}}} = \frac{1}{{}^6\sqrt{15^5}}$

g) $25^{-0,75} = 25^{-\frac{3}{4}} = \frac{1}{25^{\frac{3}{4}}} = \frac{1}{{}^4\sqrt{25^3}}$

h) $(xy)^{1,6} = (xy)^{\frac{8}{5}} = {}^5\sqrt{(xy)^8}$

Für Potenzen mit rationalen Exponenten gilt ($n \in \mathbb{N}$; $n > 1$; $m \in \mathbb{Z}$; $a > 0$):

$$a^{\frac{m}{n}} = {}^n\sqrt{a^m}$$

n nennt man **Wurzelexponent**, a^m heißt **Radikand**.

Aufgabe 4.2.

Sollst du eine Potenz als Wurzel schreiben, gehe so vor:

1. Forme zunächst so um, dass der Exponent eine positive Bruchzahl ist [(Aufg. b), f), g), h)].
2. Den Radikanden erhältst du, indem du die Basis mit dem Zähler potenzierst.
3. Notiere den Nenner als Wurzelexponenten.

4.3. Schreibe als Potenz

a) ${}^4\sqrt{18}$

b) $\frac{1}{{}^4\sqrt{18}}$

c) \sqrt{b}

d) $\frac{1}{\sqrt{b}}$

e) ${}^4\sqrt{18^3}$

f) $\frac{1}{{}^4\sqrt{18^3}}$

g) $\sqrt{b^5}$

h) $\frac{1}{\sqrt{b^5}}$

a) ${}^4\sqrt{18} = 18^{\frac{1}{4}}$

b) $\frac{1}{{}^4\sqrt{18}} = 18^{-\frac{1}{4}}$

c) $\sqrt{b} = b^{\frac{1}{2}}$

d) $\frac{1}{\sqrt{b}} = b^{-\frac{1}{2}}$

e) ${}^4\sqrt{18^3} = 18^{\frac{3}{4}}$

f) $\frac{1}{{}^4\sqrt{18^3}} = 18^{-\frac{3}{4}}$

g) $\sqrt{b^5} = b^{\frac{5}{2}}$

h) $\frac{1}{\sqrt{b^5}} = b^{-\frac{5}{2}}$

Aufgabe 4.3.

Sollst du eine Wurzel als Potenz schreiben, gehe so vor:

- Potenziere die Basis mit dem Bruch, dessen Zähler der Exponent des Radikanden und dessen Nenner der Wurzelexponent ist.

4.4. Berechne mit dem Taschenrechner

a) $18^{\frac{3}{4}}$

b) $28^{-\frac{2}{3}}$

c) ${}^4\sqrt{18}$

d) $\frac{1}{{}^6\sqrt{9^2}}$

a) $18^{\frac{3}{4}} = 18^{0,75} \approx 8,74$

b) $28^{-\frac{2}{3}} = 1 / 28^{0,66} \approx 0,11$

c) ${}^4\sqrt{18} = 18^{0,25} \approx 2,06$

d) $\frac{1}{{}^6\sqrt{9^2}} = 9^{0,33} \approx 0,48$

Um Potenzwerte näherungsweise mit dem Taschenrechner zu bestimmen, kannst du so vorgehen:

1. Schreibe Wurzeln als Potenzen $a^{m/n}$. [Aufg. c), d)].
2. Gib ein: $a^{\frac{m}{n}}$. Benutze für m/n die Bruchtaaste, evtl. auch die Vorzeichen-taste, oder schreibe als Dezimalzahl. Die $-$ Taste heißt oft auch x^y - Taste.
3. Ist $m = 1$, so kannst du auch mit der Shift - Taste arbeiten.

4.5. Umformen mithilfe der Potenzgesetze

a) $5^{\frac{2}{3}} \cdot 5^{-\frac{1}{2}}$	a) $= 5^{\frac{2}{3} - \frac{1}{2}} = 5^{\frac{1}{6}} = \sqrt[6]{5}$	<p>Für Potenzen mit rationalen Exponenten gelten die gleichen Gesetze wie für solche mit ganzzahligen Exponenten. Terme, die Wurzeln enthalten, kannst du übersichtlich umformen, wenn du zunächst die Wurzeln als Potenzen schreibst.</p> <p>$a^p \cdot a^q = a^{p+q}$ $a^p : a^q = a^{p-q}$ $a^p \cdot b^p = (a \cdot b)^p$ $a^p : b^p = (a : b)^p$ $(a^p)^q = a^{p \cdot q}$</p>
b) $6\sqrt[6]{6^7} : 3\sqrt[3]{6^2}$	b) $= 6^{\frac{7}{6}} : 6^{\frac{2}{3}} = 6^{\frac{1}{2}} = \sqrt{6}$	
c) $a^{\frac{4}{9}} \cdot a^{\frac{2}{3}}$	c) $= a^{\frac{4}{9} + \frac{2}{3}} = a^{\frac{10}{9}} = \sqrt[9]{a^{10}}$	
d) $4\sqrt[4]{x^3} : \frac{1}{\sqrt{x^5}}$	d) $= x^{\frac{3}{4}} : x^{-\frac{5}{2}} = x^{\frac{3}{4} + \frac{5}{2}} = x^{\frac{13}{4}} = \sqrt[4]{x^{13}}$	
e) $4\sqrt[4]{3} \cdot 4\sqrt[4]{27}$	e) $= 3^{\frac{1}{4}} \cdot 27^{\frac{1}{4}} = 81^{\frac{1}{4}} = (3^4)^{\frac{1}{4}} = 3$	
f) $a^{-\frac{4}{9}} : (ab)^{-\frac{4}{9}}$	f) $= \left(\frac{a}{ab}\right)^{-\frac{4}{9}} = \left(\frac{1}{b}\right)^{-\frac{4}{9}} = b^{\frac{4}{9}} = \sqrt[9]{b^4}$	
g) $(a^{-\frac{4}{9}})^{\frac{3}{4}}$	g) $= a^{-\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{4}} = a^{-\frac{1}{3}} = \frac{1}{\sqrt[3]{a}}$	
h) $3\sqrt[3]{\sqrt[3]{25^9}}$	h) $= \left(25^{\frac{9}{27}}\right)^{\frac{1}{3}} = 5^{\frac{9}{27} \cdot \frac{1}{3}} = 5$	

4.6. Wurzeln vereinfachen

a) $4\sqrt[4]{18^8}$	a) $4\sqrt[4]{18^8} = 18^{\frac{8}{4}} = 18^2 = 324$	<p>Sollst du Wurzeln so weit wie möglich vereinfachen oder berechnen, gehe so vor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfe, ob sich der Radikand als Potenz mit möglichst großem Exponenten schreiben lässt [Aufg. c) bis f), h)]. 2. Schreibe die Wurzel als Potenz, berechne den Exponenten und kürze ihn. Ist der Exponent nun ganzzahlig, rechne aus [Aufg. a) bis e)]. 3. Ist der Exponent nicht ganzzahlig, dann schreibe ihn als Bruch oder gemischte Zahl. 4. Schreibe Potenzen mit gemischten Zahlen im Exponenten als Produkt: $a^{n+p} = a^n \cdot a^p$ ($n \in \mathbb{N}$). 5. Berechne oder vereinfache.
b) $5\sqrt[5]{6^{15}}$	b) $5\sqrt[5]{6^{15}} = 6^{\frac{15}{5}} = 6^3 = 216$	
c) $18\sqrt[18]{8^6}$	c) $18\sqrt[18]{8^6} = (2^3)^{\frac{6}{18}} = 2^1 = 2$	
d) $\frac{1}{6\sqrt[6]{9^{15}}}$	d) $\frac{1}{6\sqrt[6]{9^{15}}} = (3^2)^{-\frac{15}{6}} = 3^{-5} = \frac{1}{243}$	
e) $3\sqrt[3]{27a^6}$	e) $3\sqrt[3]{27a^6} = ((3a^2)^3)^{\frac{1}{3}} = (3a^2)^1 = 3a^2$	
f) $4\sqrt[4]{32}$	f) $4\sqrt[4]{32} = (2^5)^{\frac{1}{4}} = 2^{\frac{5}{4}} = 2^1 \cdot 2^{\frac{1}{4}} = 2 \cdot \sqrt[4]{2}$	
g) $6\sqrt[6]{a^{21}}$	g) $6\sqrt[6]{a^{21}} = a^{\frac{21}{6}} = a^{\frac{7}{2}} = a^3 a^{\frac{1}{2}} = a^3 \sqrt{a}$	
h) $6\sqrt[6]{256a^{16}}$	h) $6\sqrt[6]{256a^{16}} = ((2a^2)^8)^{\frac{1}{6}} = (2a^2)^{\frac{8}{6}}$ $= (2a^2)^{\frac{4}{3}} = 2a^2 (2a^2)^{\frac{1}{3}} = 2a^2 \sqrt[3]{2a^2}$	

4.7. Potenz- und Wurzelgleichungen

a) $x^6 = 729$	a) $x^6 = 729 \Leftrightarrow$ $x = -\sqrt[6]{729}$ und $x = \sqrt[6]{729}$ $IL = \{-3; 3\}$	<p>Eine Potenzgleichung der Form $x^n = a$ ($n \in \mathbb{N}$) hat die Lösung:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>n gerade</td> <td>n ungerade</td> </tr> <tr> <td>$a > 0$</td> <td>$-\sqrt[n]{a}; \sqrt[n]{a}$</td> <td>$\sqrt[n]{a}$</td> </tr> <tr> <td>$a = 0$</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>$a < 0$</td> <td>keine Lösung</td> <td>$-\sqrt[n]{ a }$</td> </tr> </table>		n gerade	n ungerade	$a > 0$	$-\sqrt[n]{a}; \sqrt[n]{a}$	$\sqrt[n]{a}$	$a = 0$	0	0	$a < 0$	keine Lösung	$-\sqrt[n]{ a }$
	n gerade		n ungerade											
$a > 0$	$-\sqrt[n]{a}; \sqrt[n]{a}$		$\sqrt[n]{a}$											
$a = 0$	0		0											
$a < 0$	keine Lösung	$-\sqrt[n]{ a }$												
b) $x^6 + 100 = 36$	b) $x^6 + 100 = 36 \Leftrightarrow x^6 = -64$ $IL = \{ \}$													
c) $x^3 = 729$	c) $x^3 = 729 \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{729}; IL = \{ 9 \}$													
d) $x^3 + 100 = 36$	d) $x^3 + 100 = 36 \Leftrightarrow x^3 = -64$ $\Leftrightarrow x = -\sqrt[3]{ -64 }; IL = \{-4\}$													